Amerikanische

Gewächse

nach

Linneischer Ordnung.

Des zweiten Hunderts, erste Hälfte

von

Tab. 101. bis 150.



Nürnberg,
auf Kosten der Raspischen Buchhandlung.
1786.

EX CLASSE VIta.

Tab. 101.

Tillandsia lingulata. Lin. Gen. 428. Spec. 3. p. 8.
Zungenförmige Tillandsie. Lin. Pflanzenf. 6 Th. S. 304.
a. Eine ausgehobene Blume.
b. Die Saamenkapsel.
Wächst in Martinique. Dreymal so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 92.

Tab. 102.

Tillandsia tenuifolia. Linn. Gen. 428. Spec. 4. p. 8.
Schmalblättrichte Tillandsie. Linn. Pflanzensyst. 6 Th. S. 305.
Wächst in Karthagena. Noch so groß, als die Abbildung.
Tacquin Tab. 93.

Tab. 103.

Tillandsia polystachia. Linn. Gen. 428. Spec. 6. p. 9.
Vielährichte Tillandsie. Linn. Pflanzenf. 6 Th. S. 306.
Wächst in Havanah. Dreymal so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 94.

Tab. 104.

Tradescantia geniculata. Linn. Gen. 430. Spec. 4. p. 11.
Knotige Tradescantie. Linn. Pflanzenf. 6 Th. S. 312.
Wächst in Martinique. Noch so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 95.

Tab. 105.

Haemanthus puniceus. Linn. Gen. 432. Spec. 3. p. 14.
Scharlachrothe Blutblume. Linn. Pflanzensyst. 11 Th. S. 131.
a. Eine ganze Blume.
b. Eben diese geöfnet mit den fünf Staubfäden.
c. Der Fruchtknoten, Griffel und stumpfe Narbe.
d. Die Beere.
e. Diese durchschnitten.
f. Der Saame.
g. Der auswachsende Saame, aus welchem das Würzelchen
h. entspringt, das eine neue Zwiebel
i. ernährt.
Wächst in Guinea.
Trew. Tab. 44.

Tab. 106.

Pancratium illyricum. Linn. Gen. 437. Spec. 6. p. 22.

Illyrische Gilgen. Linn. Pflanzensyst. 11 Th. S. 169.

Wächst in Illyrien.

Trew. Tab. 27.

Tab. 107.

Pancratium amboinense. Linn. Gen. 437. Spec. 7. p. 23.

Amboinische Gilgen. Linn. Pflanzens. 11 Th. S. 169.

Wächst in Amboina.

Trew. Tab. 28.

Tab. 108.

Pancratium littorale. Jacqu.

Pancraticum Spatha multiflora, scapo compresso, ancipiti, corollae laciniis, tubo duplo brevioribus, foliis ensiformibus. Gen. 437.

Ufer-Gilgen. Linn. Pflanzens. 11 Th. S. 165.

Wächst in Tierra Bomba. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 101.

Tab. 109.

Pancratium declinatum. Jacqu.

Pancratium Spatha multiflora ancipiti, corollae laciniis tubum subexcedentibus, foliis lingulatis. Gen. 437.

Liegende Gilgen. Linn. Pflanzensyst. 11 Th. S. 168.

Wächst in Martinique. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 102.

Tab. 110.

Crinum Zeylanicum. Linn. Gen. 438. Spec. 3. p. 24

Zeylonische Hakenlilie. Linn. Pflanzens. 11 Th. S. 176.

Wächst in Ostindien.

Trew. Tab. 13.

Tab. 111.

Amaryllis atamasco. Linn. Gen. 439. Spec. 3. p. 25

Virginische Amaryllis. Linn. Pflanzens. 11 Th. S. 186.

a. Die länglichte, zweyspaltige, aufgesprungene Scheide.

b. b. Die sechsblättrige Krone.

c. Die sechs Staubfäden.

d. Der Fruchtknoten, gebogene Griffel und die dreytheilige Narbe.

e. Der

e. Der durchschnittene Fruchtknoten.

Wächst in Virginien.

Nach der Natur.

Tab. 112.

Amarillis belladonna. Linn. Gen. 439. Spec. 5. p. 26.

Schöne Frau. Linn. Pflanzensyst. 11 Th. S. 190.

a. Die ungeöfnete Scheide.

b. Die sechsblättrichte Krone, die drey äussern Blättgen mit einwärts gekehrten Spizen, deren eines

c. mit einem Staubfaden abgesondert ist.

d. Eines der drey innern Blättgen.

e. Die sechs Staubfäden.

f. Ein Staubbeutel.

g. Der Fruchtknoten geöfnet, mit dem gebogenen Griffel und der Narbe.

h. Die Saamenkapsel, dreyfächerig.

i. Diese durchschnitten.

k. Eben diese offen.

l. Saamen

m. die durchschnittene Zwiebel.

Wächst in Surinam ꝛc.

Miller illust. Tab. 18.

Tab. 113.

Yucca filamentosa. Linn. Gen. 463. Spec. 4. p. 84.

Fadige Yukke. Linn. Pflanzensyst. 3 Th. S. 381.

a. Eine ausgebreitete Blume fast in natürlicher Grösse, sonst sind sie halb geschlossen.

Wächst in Virginien.

Trew. Tab. 37.

Tab. 114.

Achras mammosa. Linn. Gen. 473. Spec. 1. p. 103.

Brüstenförmiger Breyapfel. Linn. Pflanzensyst. 1 Th. S. 423.

a. Eine Blume.

b. Die Frucht.

c. Der Saame.

d. Die Kerne.

Wächst in Karthagena, Kuba, Jamaika. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 59.

Tab. 115.

Achras Sapota. Linn. Gen. 473. Spec. 2. p. 104.

Gemeiner Breyapfel. Linn. Pflanzens. 1 Th. S. 425.

a. a. Zeitige Früchte.

b. Saamen.

Wächst auf den Karibäen.

Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 60.

Tab. 116.

Burfera gummifera. Linn. Gen. 475. Spec. 1. p. 105.

Gummigebende Burſere. Linn. Pflanzenſ. 1 Th. S. 433.

a. Die Blüthe.
b. Die Frucht, in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Kuba, Domingo und Jamaika. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 96.

Tab. 117.

Loranthus uniflorus. Linn. Gen. 478. Spec. 2. p. 108.

Einblumige Riemenblume. Linn. Pflanzenſyſt. 3 Th. S. 389.

Wächſt in Domingo.

Jacquin Tab. 100.

Tab. 118.

Loranthus americanus. Linn. Gen. 478. Spec. 4. p. 108.

Amerikaniſche Riemenblume. Linn. Pflanzenſyſt. 3 Th. S. 390.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 98.

Tab. 119.

Loranthus ſpicatus. Lin. Gen. 478. Spec. 9. p. 109.

Aehrenförmige Riemenblume. Linn. Pflanzenſyſt. 3 Th. S. 390.

Wächſt in Karthagena. Die Hälfte gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 99.

Tab. 120.

Hillia paraſitica. Linn. Gen. 479. Spec. 1. p. 110.

Die ſchmarozende Hillie. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 395.

a. Der Fruchtknoten mit der ſechsblättrigten Blumendeke.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 97.

Tab. 121.

Peplis tetrandra. Linn. Gen. Spec. 2. p. 113.

Amerikaniſche Peplis. Linn. Pflanzenſ. 6 Th. S. 364.

Wächſt in Havanna.

Jacquin Tab. 103.

Tab.

Tab. 122.

Petiveria octandra. Lin. Gen. 482. Spec. 2. p. 131.
Achtfädige Petiverie. Linn. Pflanzenf. 3 Th. S. 401.
Wächst auf Martinique und den Karibäen. Dreymal so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 104.

EX CLASSE VIIIva.

Tab. 123.

Oenothera octovalvis. Linn. Gen. 505. Spec. 5. p. 148.
Achtschaalige Nachtkerze. Linn. Pflanzenf. 6 Th. S. 416.
Wächst auf den Karibäen. Noch so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 105.

Tab. 124.

Melicocca bijuga. Linn. Gen. 514. Spec. 1. p. 157.
Melicocca mit zweypaarigen Blättern. Linn. Pflanzenf. 1 Th. S. 466.
a. Blume, natürlich.
b. Diese vergrössert.
c. Die Frucht.
d. Saamen – beede natürlich.
Wächst in Karthagena. Dreymal so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 109.

Tab. 125.

Amyris sylvatica. Linn. Gen. 516. Spec. 2. p. 158.
Waldbalsamstrauch. Linn. Pflanzenf. 1 Th. S. 471.
Wächst in Karthagena. Noch so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 108.

Tab. 126.

Ximenia americana. Linn. Gen. 517. Spec. 1. p. 160.
Amerikanische Ximenie. Linn. Pflanzenf. 1 Th. S. 453.
Wächst in Karthagena. Noch so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 107.

Tab. 127.

Coccolaba uvifera. Linn. Gen. 538. Spec. 1. p. 214.
Gemeine Seetraube. Linn. Pflanzenf. 1 Th. S. 289.
a. Saamen.
b. Der Kern.
Wächst auf den Karibäen. Dreymal so groß, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 110.

Tab.

Tab. 128.

Coccoloba excoriata. Linn. Gen. 538. Spec. 3. p. 215.

Rindenlose Seetraube. Linn. Pflanzenf. 1 Th. S. 494.

Wächst in Domingo und Martinique. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 115.

Tab. 129.

Coccoloba punctata. Linn. Gen, 538. Spec. 4.

Gedupfte Seetraube. Linn. Pflanzenf. 1 Th. S. 495.

Wächst in Karthagena. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 114.

Tab. 130.

Coccoloba obtusifolia. Jacquin.

Coccoloba foliis oblongis obtusissimis. Gen. 538.

Wächst in Karthagena. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 111.

Tab. 131.

Coccoloba flavescens. Jacqu.

Coccoloba foliis lanceolato-oblongis, obtusis mucronatis. Gen. 538.

Wächst in Domingo. Nicht viel grösser, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 112.

Tab. 132.

Coccoloba diversifolia. Jacqu.

Coccoloba foliis ramusculorum ovatis, ramorum ovato-cordatis. Gen. 538.

Wächst in Domingo. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 113.

EX CLASSE IXna.

Tab. 133.

Cassyta filiformis. Linn. Gen. 548. Spec. 1. p. 230.

Fadenförmige Cassytha. Linn. Pflanzenf. 6 Th. S. 469.

a. Die Frucht mit dem Mark durchschnitten.

b. Saamen. Beyde in natürlicher Grösse.

Wächst in Tierra bomba. Nicht viel grösser, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 116.

Tab.

Tab. 134.

Cassytha baccifera.

Cassytha polysperma. D. Solander.

a. Der dreyblättrige Kelch von oben.

b. Dieser von der Seite auf dem Fruchtknoten.

c. Die dreyblättrige Krone mit den neun Staubfäden und dem Stempfel.

d. Alle diese Theile, nebst dem Honigbehältnisse, im Umriß.

e. Die Geschlechtstheile ausgebreitet.

f. Der Fruchtknoten, dicke Griffel und dreispaltige stumpfe Narbe.

g. Die Frucht mit dem Kelch bekränzt.

h. Diese nach der Länge und

i. nach der Queere durchschnitten.

k. Saamen.

Wächst in Indien.

Eine vom D. Solander neu entdeckte Pflanze.

Miller Illust. Tab. 29.

EX CLASSE X.

Tab. 135.

Parkinsonia aculeata. Linn. Gen. 555. Spec. 2. p. 248.

Stachlichte Parkinsonie. Linn. Pflanzens. 1 Th. S. 563.

a. Saamen.

Wächst in den Karibäen. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 119.

Tab. 136.

Poinciana pulcherrima. Linn. Gen. 557. Spec. 2. p. 258.

Schönste Poinciane. Linn. Pflanzens. 3 Th. S. 528.

Wächst in den Karibäen. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 120.

Tab. 137.

Trichilia trifoliata. Linn. Gen. 573. Spec. 2. p. 270.

Dreyblättrichte Trichilie. Linn. Pflanzens. 1 Th. S. 601.

a. Die ausgebreitete Kapsel.

b.b. Zween Saamen. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Curacao. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 119.

Tab. 138.

Zygophyllum arboreum. Linn. Gen. 577. Spec. 2. p. 248.

Baumartiges Doppelblatt. Linn. Pflanzenſyſt. 1 Th. S. 275.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 124.

Tab. 139.

Heiſteria coccinea. Linn. Gen. 586. Spec. 2. p. 283.

Scharlachrothe Heiſterie. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 544.

Wächſt auf Martinique und den Karibäen. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 122.

Tab. 140.

Melaſtoma diſcolor. Linn. Gen. 589. Spec. 10. p. 247.

Buntblättrichter Schwarzmund. Linn. Pflanzenſyſt. 1 Th. S. 629.

Wächſt in Martinique. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 125.

Tab. 141.

Samyda parviflora. Linn. Gen. 609. Spec. 1. p. 301.

Kleinblümige Samyda. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 581.

Wächſt in Martinique.

Jacquin Tab. 127.

Tab. 142.

Samyda nitida. Linn. Gen. 600. Spec. 2. p. 302.

Glänzende Samyda. Linn. Pflanzenſ. 3 Th. S. 582.

a. Der aufgeſchnittene Kelch mit den acht Staubfäden und dem Honigbehältniß.

Wächſt in Karthagena. Nicht viel gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 126.

Tab.

Tab. 143.

Erythroxylon areolatum. Linn.
Gen. 625. Spec. 1. p. 374.
Karthaginenſiſches Rothholz.
Linn. Pflanzenſyſt. 1 Th.
S. 653.

a. Die ganze Frucht.
b. Die entzwey geſchnittene Nuß.

Wächſt in Karthagena. Nicht viel gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 129.

Tab. 144.

Erythroxylon havanenſe. Linn.
Gen. 725. Spec. 2. p. 374.
Havaniſches Rothholz. Linn.
Pflanzenſ. 1 Th. S. 655.

Wächſt in Havana. Nicht viel gröſſer als die Abbildung.

Jacquin Tab. 130.

Tab. 145.

Spondias Myrobolanus. Linn.
Gen. 726. Spec. 2. p. 374.
Myrobalanen Baum. Linn.
Pflanzenſ. 1 Th. S. 664.

a. Die Frucht.
b. Die Nuß.
c. Dieſe durchſchnitten. Alle in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in den Karibäen, Karthagena ꝛc. Die Hälfte ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 131.

Tab. 146.

Myroſpermum fruteſcens. Jacq.

a. Die Frucht.
b. Saamen. Beyde in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Noch ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 118.

EX CLASSE XIma.

Tab. 147.

Triumfetta Bartramia. Linn.
Gen. 655. Spec. 2. p. 420.
Bartramiſche Triumfette. Linn.
Pflanzenſ. 7 Th. S. 5.

Wächſt in Martinique. Die Hälfte gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 137.

Tab. 148.

Triumfetta ſemitriloba. Linn.
Gen. 655. Spec. 3. p. 420.
Halbdreylappichte Triumfette. Linn. Pflanzenſ. 7 Th. S. 6.

a. Die Frucht, in natürlicher Gröſſe.

Jacquin Tab. 133.

Tab.

Tab. 149.

Portulaca triangularis. Linn. Gen. 659. Spec. 5. p. 425.

Dreyeckichter Portulack. Linn. Pflanzenſ. 6 Th. S. 11.

Wächſt in den Karibäen.

Jacquin Tab. 135.

Tab. 150.

Portulaca patens. Linn. Gen. 659. Spec. 7. p. 425.

Riſpenförmiger Portulack. Pflanzenſ. 7 Th. S. 12.

Wächſt in Martinique und Domingo. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 136.

Amerikanische Gewächse

nach

Linneischer Ordnung.

Des zweiten Hunderts zwote Hälfte

von

Tab. 151. bis 200.

Nürnberg,
auf Kosten der Raspischen Buchhandlung.
1787.

Tab. 151.

Ginora americana. Linn. Gen. 661. Spec. 1. p. 449.
Die americanische Ginore.
Linne Pflanzensyst. 3 Th. S. 618.
Wächst in Cuba. Nicht viel grösser, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 137.

Tab. 152.

Euphorbia tithymaloides. Linn. Gen. 665. Spec. 11. p. 438.
Myrtenblättrichte Euphorbie.
Linne Pflanzensyst. 7 Th. S. 44.

a. Die Blätter sind viermal grösser, als hier.
b. Die Blüthe in natürlicher Grösse.

Wächst in den Karibäen.
Jacquin Tab. 138.

Tab. 153.

Euphorbia graminea. Linn. Gen. 665. Spec. 27. p. 443.
Grasigte Euphorbie. Linne Pflanzens. 7 Th. S. 55.

a. Eine vergrösserte Blume.

Wächst in Karthagena. Die Hälfte grösser, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 139.

Tab. 154.

Cactus flagelliformis. Linn. Gen. 668. Spec. 14. p. 468.
Rankenförmige Fackeldistel.
Linne Pflanzensyst. 3 Th. S. 631.

a. Die ganze Blume.
b. Diese nach der Länge durchschnitten.
c. c. Der Kelch mit haarigten Schuppen.
d. Die vielen Staubfäden, in deren Mitten
e. der viel kürzere Stempfel.
f. Die vergrösserte Narbe mit dem Befruchtungsstaub.
g. Ein vergrösserter Staubbeutel.
h. Die unzeitige Frucht.
i. Die zeitige Frucht, in natürlicher Grösse.
k. Diese durchschnitten mit den Saamen.
l. Saamen.
m. Dieser vergrössert.
n. Ein Stück des Hauptstengels.

Wächst im mittäglichen Amerika.
Trew Tab. 30.

Tab. 155.

Psidium pyriferum. Linn. Gen. 670. Spec. 1. p. 473.
Birntragender Cujavabaum. Linne Pflanzensyst. 1 Th. S 699.
a. Die Frucht.
b. Diese durchschnitten.
c. Saamen.
Wächst in Indien.
Trew. Tab. 43.

Tab. 156.

Eugenia pseudo-psidium. Linn. Gen 671 Spec. 3. p. 475.
Bastard Cujavabaum. Linne Pflanzens. 1 Th. S. 709.
a. Saamen in natürlicher Grösse.
Wächst in Martinique. Noch so groß, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 140.

Teb. 157.

Chrysobalanus icaco. Linn. Gen. 677. Spec. 1. p 490.
Cocospflaumen. Linne Pflanzensyst. 1 Th. S. 756.
Wächst in den Karibäen. Noch so groß, als die Abbildung.
Jacquin Tab. 141.

Tab. 158.

Sesuvium portulacastrum. Linn. Gen. 680. Spec. 1. p. 496.
Portulacartiges Sesuvium. Linne Pflanzensyst. 7 Th. S. 96.
Wächst in den Karibäen. Noch so groß als die Abbildung.
Jacquin Tab. 142.

Tab. 159.

Mesembryanthemum noctiflorum. Linn. Gen. 684. Sp. 5. p. 506.
Nachtzaserblume. Linne Pflanzens. 7 Th. S. 102.
a. Der halbvierspaltige Kelch.
b. Die einblätrige, vieltheilige Krone.
c. Eben diese geöfnet.
d. Die zahlreichen Staubfäden, im Kelch eingefügt.
e. Ein Staubfaden.
f. Der stumpf viereckigte Fruchtknoten, mit den vier Griffeln, und einfachen Narben.
Wächst auf dem Vorgebürge der guten Hofnung.
Nach der Natur.

Tab.

EX CLASSE XIIIa.

Tab. 160.

Maregrafia umbellata. Linn. Gen. 696. Spec. 1. p. 562.
Doldentragende Maregravie. Linne Pflanzensf 4 Th. S. 1.
a. Die Frucht in natürlicher Grösse.

Wächst in den Karibäen. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab 143.

Tab. 161.

Capparis frondosa. Linn. Gen. 699. Spec. 4. p. 564.
Buschichte Kappern. Linne Pflanzensyst. 4 Th. S. 6.
a. Die Frucht in natürlicher Grösse.

Wächst in Karthagena und Domingo. Noch so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 153.

Tab. 162.

Capparis ferruginea. Linn. Gen. 699. Spec. 5. p. 564.
Octandra Jacquin.
Rostfärbige Kappern. Linne Pflanzensf. 4 Th. S. 7.

Wächst in Domingo. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 149.

Tab. 163.

Capparis cynophallophora. Lin. Gen. 699 Spec. 7. p. 565.
Langschwänzte Kappern. Linne Pflanzensf. 4 Th. S. 9.
a. Die Frucht.
b. Ein Querschnitt derselben. Beide in natürlicher Grösse.

Wächst in den Karibäen und in Venezuela. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 145.

Tab. 164. 165.

Capparis pulcherrima. Linn. Gen. 699. Spec. 8. p. 565.
Schönste Kappern. Linne Pflanzensyst. 4 Th. S. 11.
a. Die Frucht.
b. Saamen. Beide in natürlicher Grösse.

Wächst in Karthagena. Zwey und ein halbmal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 155.

Tab. 166.

Capparis linearis. Linn. Gen. 699. Spec. 9. p. 566.
Schmalblättrichte Kappern. Linne Pflanzensf. 4 Th. S. 12.

Wächst in Karthagena und Venezuela. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 151.

Tab. 167.

Capparis Breynia. Linn. Gen. 699. Spec. 10. p. 566.

Breynie. Linne Pflanzensyst. 4 Th. S. 12.

Wächst in den Karibäen. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 152.

Tab. 168.

Capparis haſtata. Linn. Gen. 699. Spec. 11. p. 566.

Spondenblätterichte Kappeen. Linn. Pflanzenſ. 4 Th. S. 13.

Wächst in Karthagena. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 147.

Tab. 169.

Capparis euſtachiana. Jacquin.
Capparis pedunculis multiſloris, foliis ovatis, acuminatis, utrinque nitidis, fructibus glabris. Gen. 699.

Wächst in Karthagena. Noch so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 146.

Tab. 170.

Capparis verrucoſa. Jacquin.
Capparis pedunculis multiſloris, foliis oblongis, acutis utrinque nitidis, fructu verrucoſo. Gen. 699.

a. Die Frucht in natürlicher Gröſſe.

Wächst in Karthagena. Um die Hälfte gröſſer, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 148.

Tab. 171.

Capparis Jamaicenſis. Jacquin.
Capparis pedunculis multiſloris, foliis oblongis, emarginatis, ſubtus tomentoſis, corollis ſemierectis. Gen. 699.

Wächst in Jamaika. Noch so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 150.

Tab. 172.

Capparis tenuiſiliqua. Jacquin.
Capparis racemis ſimplicibus, erectis, fructibus, ſiliquoſis, foliis deciduis. Gen. 699.

a. Die Frucht.

b. Saamen. Beede in natürlicher Gröſſe.

c. Ein Hauptblatt, iſt in der Natur dreymal gröſſer.

Wächst in Karthagena. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 154.

Tab.

Tab. 173.

Capparis nemorosa. Jacquin.

Capparis floribus racemosis, foliis acuminatis, fructu baccato. Gen. 699.

Wächst in Karthagena. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 156.

Tab. 174.

Muntingia calabura. Linn. Gen. 707. Spec. 1. p. 576.

Calabura. Linne Pflanzens. 4 Th. S. 15.

Wächst in Domingo. Dreymal grösser, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 158.

Tab. 175.

Sarracenia flava. Linn. Gen 708. Spec. 1. p. 577.

Gelbe Sarracenie. Linne Pflanzensyst. 7 Th. S. 210.

a. Die gedoppelte Blumendecke.
b. Ein Blättgen der kleinen dreyblätrichten.
c. Ein Blatt der grossen fünf blätterichten.
d. Die fünfblätterige Krone.
e. Ein Kronblatt.
f. Die zalreichen Staubfäden.
g. Ein abgesonderter.
h. Der Fruchtknoten mit dem walzenförmigen Griffel und der schildförmigen fünfeckigten Narbe.
i. Die Saamenkapsel.
k. Diese Queer durchschnitten.
l. Die fünffächerige Saamenkapsel aufgesprungen.
m. Ein Fach derselben.
n. Saamen.

Wächst im mitternächtlichen Amerika.

Miller Illustr. Tab. 46.

Tab. 176.

Mammea americana. Linn. Gen. 713. Spec. 1. p. 581.

Amerikanischer Mammeybaum. Linne Pflanzens. 2 Th. S. 16.

a. Die Blume.
b. Der Saamen. Beide in natürlicher Grösse.
c. Die Frucht.

Wächst in den Karibäen. Viermal so groß, als die Abbildung.

Tab. 177.

Calophyllum calaba. Linn. Gen. 716. Spec. 2. p. 583.
Kleines Schönblatt. Linne Pflanzenf. 2 Th. S. 28.

a. Die Frucht.
b. Die Nuß. Beide in natürlicher Grösse.

Wächst in Martinique. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 249.

Tab. 178.

Laetia apetala. Linn. Gen. 718. Spec. 1. p. 585.
Unvollkommene Laetie. Linne Pflanzenf. 2 Th. S. 37.

a. Die Frucht. In natürlicher Grösse.

Wächst in Karthagena. Noch so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 159.

Tab. 179. 180.

Lecythis minor. Linn. Gen. 720. Spec. 2. p. 586
Kleiner Topfbaum. Linne Pflanzenf. 2 Th. S. 45.

a. Das Honigbehältniß ausgebreitet, trägt unten die Staubfäden, und ist für den Fruchtknoten durchbohrt. Oben stehen gelbe Haare, welche eingebogen sind und die Geschlechtstheile überdecken.
b. Die Frucht, den Deckel auf beiden Seiten zeigend.
c. Saamen.
d. Die Frucht selbst, mit abgehobenem Deckel und ausgenommenem Saamen. Alle drey Stücke in natürlicher Grösse.

Wächst in Karthagena. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 160.

Tab. 181.

Corchorus hirsutus. Lin. Gen. 730. Spec. 6. p. 607.
Zotiger Corchorus. Linne Pflanzensyst. 7 Th. S. 245.

Wächst in Havana und Kurakao. Etwas grösser, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 157.

Tab. 182. 183.

Poeonia tenuifolia. Linn. Gen. 732. Spec. 3. p. 610.
Schmalblätterichte Pöonie. Lin. Pflanzenf. 7 Th. S. 248.

a. Der Kelch, fünfblätterigt, deren eines sich öfters in ein Kronblatt
a. endigt.

b. Die

b. Die achtblättrige Krone.
c. Die sehr zahlreichen Staubfäden.
β. Ein vergrösserter.
d. Die drey Fruchtknoten, mit purpurfarbenen Haaren besezt, nebst den drey länglichten Narben.
e. Ein Fruchtknoten nach der Länge durchschnitten.
f. Saamen.

Wächst in der Ukraine und in Siebenbürgen.

Nach der Natur.

Tab. 184.

Aquilegia canadensis. Lin. Gen. 741. Spec. 4. p. 620.
Canadische Akeley. Lin. Pflanzens. 7 Th. S. 270.

a. Die fünfblättrige Krone.
b. Diese fünf Blätter ohne die Honigbehältnisse.
c. Die fünf Honigbehältnisse.
d. Eines derselben abgesondert.
e. Dieses geöfnet.
f. Die vielen Staubfäden.
g. Ein abgesonderter.
h. Fünf kürzere Staubfäden, die mit einer Haut zusammenhängen, und die übrigen Staubfäden umgeben.
i. Die acht Fruchtknoten mit den pfriemenförmigen Griffeln und kaum merklichen Narben.
k. Ein abgesonderter.

Wächst in Kanada, Virginien ꝛc.

Nach der Natur.

Tab. 185. 186.

Magnolia grandiflora. Linn. Gen. 748. Spec. 1. p. 625.
Grosblumige Magnolie.
Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 75.

a. Blüthenknospe.
b. Die Hülle mit der noch eingeschlossenen Knospe.
c. Die unaufgeblühte Knospe, noch mit der Scheide bedekt.
d. Diese in grösserm Wachsthum, mit aufgesprungener Scheide.
e. Das Ende des Zweigs, auf welchem die Blume sitzt, nebst einem Stük eines Blattstiels.
f. Die abgesonderte Scheide.
g. Der gänzlich entblößte Blumenknopf.
h. Der Fruchtknoten, mit den vielen Stempfeln. Unten in
i. ist die Axe, um welche die zalreichen Staubfäden stehen, deren einer an

k. von innen, mit den, der Länge nach, an den Seiten angewachsenen Staubbeuteln, und an
l. von aussen abgebildet ist.
m. Die zeitige Frucht mit den vielen Kapseln, und einigen noch festsizenden zeitigen Beeren.
n. Die an Fäden aus der Oefnung der Schuppen herunterhängenden Beere oder Saamen.
o. Eine abgesonderte schon aufgesprungene Schuppe, mit der Beere.
p. Eine solche, mit der herunterhangenden Beere, und dem noch bleibenden Griffel.
q. Saamen von beiden Seiten.

Wächst in Florida und Karolina.

Trew Tab. 35.

Tab. 187.

Annona muricata. Linn. Gen. 751. Spec. 1. p. 628.

Zacigter Flaschenbaum. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 89.

a. Der Stempfel nach abgefallenen Blättern und Staubfäden.
b. Die Frucht.

Wächst in den Karibäen. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 161.

Tab. 188. 189.

Annona squamosa. Linn. Gen. 751. Spec. 2. p. 629.

Schuppichter Flaschenbaum. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 95.

a. Die ausgebreitete Blume.
b. Die Frucht.
c. Saamen. Alle drey in natürlicher Grösse.

Wächst in den Karibäen. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 162.

EX CLASSE XIVta.

Tab. 190.

Teucrium cubense. Linn. Gen. 764. Spec. 18. p. 17.

Westindischer Gamander. Lin. Pflanzens. 2 Th. S. 360.

Wächst in Cuba. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 164.

Tab.

Tab. 191.

Ballota ſuaveolens. Linn. Gen. 778. Spec. 4. p. 63.
Wohlriechende Ballote. Linne Pflanzenſ. 7 Th. S. 488.
a. Die Blume vergröſſert.
b. Dieſe von der Seite.
c. Der Kelch natürlich.

Wächſt in den Karibäen. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 163.

Tab. 192.

Scutellaria havanenſis. Linn. Gen. 792. Spec. 10. p. 99.
Havaniſches Helmkraut. Linne Pflanzenſyſt. 7 Th. S. 573.
Wächſt in Havana. Noch ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 165.

Tab. 193.

Craniolaria annua. Linn. Gen. 810. Spec. 2. p. 141.
Jährige Schädelnuß. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 49.
a. Die Saamenkapſel.
b. Dieſe queer durchſchnitten. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Kartbagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 166.

Tab. 194.

Besleria criſtata. Linn. Gen. 813. Spec. 3. p. 144.
Hahnenkammartige Beßlerie. Lin. Pflanzenſ. 4 Th. S. 56.
Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 180.

Tab. 195.

Bignonia paniculata. Linn. Gen. 817. Spec. 5. p. 156.
Riſpentragende Bignonie. Linn. Pflanzenſ. 4 Th. S. 60.
a. Die Saamenkapſel.
b. Saamen. Beide in natürlicher Gröſſe.

Wächſt in Karthagena. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 175.

Tab. 196.

Bignonia ſtans. Linn. Gen. 817. Spec. 14. p. 195.
Aufrechte Bignonie. Linne Pflanzenſ. 4 Th. S. 64.
Wächſt in Martinique. Dreymal ſo groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 176.

Tab. 197.

Cytharexylum cinereum. Linn. Gen. 760. Spec. 1. p. 160.
Aschgrauer Geigenholzbaum. Lin. Pflanzenf. 2 Th. S. 119.

a. Die Blüthe.
b. Saamen von beyden Seiten. Beyde in natürlicher Grösse.

Wächst in Martinique. Noch so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 178.

Tab. 198.

Crescentia Cujete. Linn. Gen. 820. Spec. 1. p. 161.

Der Cujete. Linne Pflanzensyst. 2 Th. S. 126.

Wächst in den Karibäen. Dreymal so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 197.

Tab. 199.

Petrea volubilis. Linn. Gen. 822. Spec. 1. p. 163.
Windenartige Petree. Linne Pflanzenf. 4 Th. S. 64.

Wächst in Martinique. Dreymal so groß, als die Abbildung.

Jacquin Tab. 173.

Tab. 200.

Capraria biflora. Linn. Gen. 827. Spec. 1. p. 168.
Zweyblumige Herzblume. Lin. Pflanzensyst. 4 Th. S. 79.

a. Ein im Schatten ausgewachsenes Blatt, in natürlicher Grösse.

Wächst in den Karibäen. Noch so groß als die Abbildung.

Jacquin Tab. 174.

Tillandsia lingulata. L.

Tillandsia tenuifolia. L.

Tillandsia polystachia. L.

Tradescantia geniculata. L.

Hæmanthus puniceus. L.

Pancratium illyricum. L.

Pancratium Amboinense. L.

Pancratium littorale. 3.

Pancratium declinatum. 3.

Crinum Zeylanicum. L.

Amaryllis atamaſco. L.

Amaryllis belladonna. L.

Yucca filamentoſa. L.

Achras mammosa. L.

Achras sapota. L.

Bursera Gumifera. L.

Loranthus uniflorus. L.

Loranthus americanus. L.

Loranthus spicatus. L.

Hillia parasitica. L.

Peplis tetrandra. L.

Petiveria octandra. L.

Claſs. 8. Tab. 123.

Oenothera octovalvis. L.

Melicocca bijuga. L.

Cl. 8. Tab. 125.

Amyris sylvatica L.

Cl: 8. Tab: 126.

Ximenia americana. L.

Cl: 8. Tab: 127.

Coccolaba uvifera L.

Cl:8 Tab:128.

Coccolaba excoriata. L.

Cl: 8 Tab: 129.

Coccoloba punctata. L.

Cl: 8. Tab: 130.

Coccoloba obtusifolia. J.

Coccoloba flavescens. S.

Cl. 8. Tab. 132.

Coccoloba diversifolia. T.

Cl. 9. Tab. 133.

Cassyta filiformis L.

Cl: g. Tab: 34

Caffyta baccifera

Cl:10 Tab:135.

Parkinsonia aculeata. L.

Clio. Tab. 136.

Poinciana pulcherrima L.

Cl. 10. Tab. 137.

Trichilia trifoliata. L.

Cl. 10. Tab: 138.

Zygophyllum arboreum. L.

Cl:10. Tab:139.

Heisteria coccinea. L.

Cl: 10 Tab: 140.

Melastoma discolor. L.

Cl:10. Tab:141.

Samyda parviflora L:

Cl:10. Tab:142.

a

Samyda nitida. L.

Cl:10 Tab:143.

Erythroxylon areolatum. L.

Cl:10 Tab:144.

Erythroxylon havanense L.

a

b

c

Spondias mirobalanus. L.

Cl. 10. Tab. 146.

Myrospermum frutescens J.

Triumfetta bartramia L

Cl: ii. Tab: 145.

Triumfetta semitriloba L.

Cl: 11. Tab: 149.

Portulaca triangularis. L.

Cl: 11. Tab: 150.

Portulaca patens. L.

Ginora americana. L.

Euphorbia tithymaloides. L.



Euphorbia graminea. L.

Cactus flagelliformis. L.

Pſidium pyriferum. L.

Eugenia pseudo-psidium. L.

Class: 12. Tab. 157.

Chrysobotanus icaco. L.

Sesuvium portulacastrum. L.

Mesembryanthemum noctiflorum. L.



Marcgravia umbellata. L.

Capparis frondosa. L.

Capparis ferruginea. L.

Cl. 13. Tab. 163.

Capparis cynophal lophora L.

Cl:13 Tab:164.

Capparis pulcherrima. L.

Cl. 13. Tab: 165.

Capparis pulcherrima L.

A. 13. Tab: 166.

Capparis linearis L.

Cl: 13. Tab: 167.

Capparis Breynia. L.

Capparis hastata L.

Cl. 13. Tab: 169.

Capparis eustachiana. F.

Capparis verrucosa. F.

Capparis Jamaicensis. J.

Capparis tenuisiliqua. J.

Capparis nemorosa. 3.

Muntingia calabura. L.

Sarracenia flava L.

Mamea americana. L.

Calophyllum calaba. L.

Cl: 13. Tab 178.

Laetia apetala. L.

Cl: 13 Tab: 179.

Lecythis minor L.

Cl. 13. Tab. 180.



Lecythis minor. L

Corchorus hirsutus. L.

Cl: 13. Tab: 182.

Poeonia tenuifolia. L.



Paeonia tenuifolia L.

Aquilegia canadensis. L.

Magnolia grandiflora L.

Magnolia grandiflora. L.

Class: 13. Tab. 187.

Annona muricata. L.

Annona squamosa. L.

Annona squamosa. L.

Teucrium cubense. L.

Cl:14. Tab:191.

Ballota suaveolens. L.

Cl: 14. Tab: 192.

Scutellaria havanensis L.

Craniolaria annua L.

Cl: 14. Tab: 194.

Besleria cristata. L.

Bignonia paniculata. L

Cl: 14. Tab: 196.

Bignonia stans. L.

Cl: 14. Tab: 197.

Citharexylum cinereum. L.

Cl:14. Tab:198.

Crescentia cujete. L.

Cl: 14 Tab: 199.



Petraea volubilis. L.

Cl: 14 Tab: 200.

Vogel fe.

Capraria biflora. L.